



ミニトマト編

病害虫注意報 2022年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナジラミ類・ハモグリバエ類 対策

天窓開閉の多くなる2月後半からコナジラミ類が増加します。また、ハモグリバエ類の発生も増えてきますので発生初期を見逃さず、しっかり防除を行っていきましょう！

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期 | 対象病害虫 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 マルハバチ |
|---------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|------|----|---------------|
| 3月 ① | コナジラミ類・ミカンキロアザミワ トマトヒゲダニ 等 | マッチ乳剤 | 2,000倍 | 前日 | 2回 | 1日 |
| | うどんこ病・ハダニ類 コナジラミ類・アブラムシ類 | フーモン ※野菜類登録 | 1,000倍 | 前日 | - | 0日 |
| 3月 ② | コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトヒゲダニ・オオハコガ | アフーム乳剤 | 2,000倍 | 前日 | 5回 | 2日 |
| 3月 ③ | コナジラミ類・ハモグリバエ類 アザミワ類・オオハコガ 等 | ディアナSC | 2,500~5,000倍 (コナジラミ類2,500倍) | 前日 | 2回 | 1~3日 |
| 3月 ④ | コナジラミ類・トマトヒゲダニ | クリアザールフロアブル | 2,000~4,000倍 (トマトヒゲダニ2,000倍) | 前日 | 2回 | 1日 |
| | コナジラミ類・ハダニ類 アブラムシ類・うどんこ病 | フーモン ※野菜類登録 | 1,000倍 | 前日 | - | 0日 |

灰色かび病・うどんこ病対策オススメ剤

| 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 マルハバチ | 登録有無 | |
|------------------|-------------------------------|------|----|---------------|-------|-------|
| | | | | | 灰色かび病 | うどんこ病 |
| 予 アフェットフロアブル | 2,000~4,000倍 (灰色かび病2,000倍) | 前日 | 3回 | 1日 | ○ | ○ |
| 予・治 シグナムWDG | 2,000倍 | 前日 | 2回 | 0日 | ○ | ○ |
| 予・治 ショウチノスケフロアブル | 2,000倍 | 前日 | 2回 | 0日 | ○ | ○ |
| 予・治 ファンタジスタ顆粒水和剤 | 2,000~3,000倍 | 前日 | 3回 | 1日 | ○ | ○ |
| 予・治 ピクシオDF | 2,000倍 | 前日 | 4回 | 1日 | ○ | ○ |
| 予 セイビアーフロアブル20 | 1,000~1,500倍 | 前日 | 3回 | 0日 | ○ | ○ |

萎れ・葉焼け対策に

ファイトカル

1,000倍 7~10日おきに葉面散布

- ▶優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有



アミスター、無機銅、ホルモン剤 肥料登録 生第83188号
液肥類等との混用は出来ません

高温対策に!

効果の持続は約1か月

すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防! 更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ 10a当たり10~20錠

