



# トマト編

## 病害虫注意報 2022年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### コナジラミ類・ハモグリバエ類 対策

天窓開閉の多くなる2月後半からコナジラミ類が増加します。また、ハモグリバエ類の発生も増えてきますので発生初期を見逃さず、しっかり防除を行っていきましょう！

### 今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ
3月 ①	コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトヒゲナシ等	マッチ乳剤	2,000倍 (ハモグリバエ類1,000倍)	前日	4回	1日
	うどんこ病・ハダニ類 コナジラミ類・アブラムシ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日
3月 ②	コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトヒゲナシ・オオハコガ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日
3月 ③	コナジラミ類・ハモグリバエ類 アザミマダニ類・オオハコガ等	ディアナSC	2,500~5,000倍 (コナジラミ類2,500倍)	前日	2回	1~3日
3月 ④	コナジラミ類・トマトヒゲナシ	クリアザールフロアブル	2,000~4,000倍 (トマトヒゲナシ2,000倍)	前日	2回	1日
	コナジラミ類・ハダニ類 アブラムシ類・うどんこ病	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日

### 灰色かび病・うどんこ病対策オススメ剤

薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ	登録有無	
					灰色かび病	うどんこ病
予 アフェットフロアブル	2,000~4,000倍 (灰色かび病2,000倍)	前日	3回	1日	○	○
予・治 シグナムWDG	2,000倍	前日	2回	0日	○	○
予・治 ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日	○	○
予・治 ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍	前日	3回	1日	○	
予・治 ピクシオDF	2,000倍	前日	4回	1日	○	
予 セイビアーフロアブル20	1,000~1,500倍	前日	3回	0日	○	

#### 萎れ・葉焼け対策に

### ファイトカル

1,000倍 7~10日おきに葉面散布

- ▶優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有



アミスター、無機銅、ホルモン剤 肥料登録 生第83188号  
液肥類等との混用は出来ません

#### 高温対策に!

効果の持続は約1か月

### すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防! 更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ 10a当たり10~20錠

