



イチゴ編

病害虫注意報 2022年4月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫も終盤です。最後まで病害虫を蔓延させないために防除を行いましょう！

今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハナ	ミカ	刊
4月 ①	うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
	ハダニ類	ダニオーテフロアブル <small>卵に効果あり</small>	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
4月 ②	アザミウマ類	ファインセーブフロアブル	1,000～ 2,000倍	前日	3回	1日		0日	
	アブラムシ類 コガネムシ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日	3回	0日		0日	
4月 ③	うどんこ病	ラリー乳剤	5,000倍	前日	3回	0日		0日	
	ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
4月 ④	アザミウマ類 ハダニ類 等	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日		100 日以上	- ※

注意！※

グレーシア乳剤は各種天敵へ長期間影響がございます。天敵放飼中の使用は避けてください。

高温対策に！

効果の持続は約1か月

すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10aあたり10～20錠



萎れ・葉焼け予防に！

ファイトカル

7～14日おきに葉面散布

▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを！！

▶ 有機酸とトレハロースによるWキレート

カルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類等との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号