



キャベツ編

病害虫注意報 2022年4月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナガ・ナメクジ 対策



コナガ

被害

- ▶ 薄皮や葉脈を残した食害をする。
- ▶ 生長点へ侵入する個体もある。

多発条件

- ▶ 25～30℃の気温 (生育最低10℃)
- ▶ 乾燥条件 (少雨)



ナメクジ

被害

- ▶ 葉を加害し、大きな穴が空く。
- ▶ 葉に這った後、粘膜の筋が乾燥して銀色に光って見える。

多発条件

- ▶ 湿潤条件
- ▶ 梅雨時期
- ▶ 残渣・雑草が圃場にある場合

おすすめ防除ローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	回数
①	コナガ・ハママダラノメイガ ハモンヨトウ・タナギンウバ等	アフーム乳剤	1,000～2,000倍	前日	3回
②	コナガ・ハママダラノメイガ ハモンヨトウ・ウバ類 等	ブロフレアSC	2,000～4,000倍	前日	3回
③	コナガ・ナメクジ類 アブラムシ類・アムシ 等	リーフガード顆粒水和剤	1,500倍	7日前	3回
④	コナガ・アザミウマ類 ハモンヨトウ・オオバコガ等	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回

その他おすすめ薬剤

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

対象病害虫	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	回数
コナガ	アニキ乳剤	1,000～2,000倍	3日前	3回
	トルネードエースDF	1,000～2,000倍	7日前	2回
	グレースシア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回
ナメクジ類	ナメクリーン3	1～3kg/10a 株元散布	14日前	2回

チップバーン 予防に!

ファイトカル

10～14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを!!

- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤 液肥類等との混用は出来ません。 肥料登録 生第83188号



弱った株の回復に!

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布! カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤 (ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録 生第91402号