



ミニトマト編

病害虫注意報 2022年4月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

うどんこ病にご注意ください！



症状 ▶主に葉に発生し、葉表・葉裏に白い菌叢を生じる。

多発条件 ▶20～28℃（表生型）
18～25℃（内生型）の温度

条件 ▶ハウス内の多湿条件で発病しやすい。
▶乾燥条件では孢子を飛散し、感染拡大しやすい。

対策 ▶罹病葉・株の除去し、適切に処分する。

▶適切な肥培管理を行う。

▶圃場周辺の除草を行う。

今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ
4月 ①	うどんこ病 トマトバグニ・コナジラミ類 予	パルミノ	2,000倍	前日	5回	3～5日
4月 ②	トマトバグニ・ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	1回	1日
	うどんこ病・アブラムシ類 コナジラミ類・ハダニ類	フーモン	1,000倍	前日	-	0日
4月 ③	うどんこ病・灰色かび病 すすかび病 等 予・治	シグナムWDG	2,000倍	前日	2回	0日
	コナジラミ類・トマトバグニ アザミウマ類 等	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
4月 ④	トマトバグニ・アザミウマ類 ハダニコナジラミ類 (シルバーフィロフィラを含む)	ファインセーブフロアブル	1,000倍 (アザミウマ類は 1,000～2,000倍)	前日	3回	1日

高温対策に！

効果の持続は約1か月

すずみどり

香り成分で、葉焼けや
萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10a当たり10～20錠



萎れ・葉焼け予防に！

ファイトカル

7～10日おきに葉面散布

▶優れた展着性・浸透性で、
葉先や果実の先までカルシウムを！！

▶有機酸とトレハロースによるWキレート

カルシウム含有 **アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類等との混用は出来ません**



肥料登録
生第83188号