



イチゴ編

病害虫注意報 2022年5月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

苗床での病害虫発生を防ぐためにも 親株床から徹底防除に努めましょう！

親株床おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルバケ	ミヤコ	刈
5月 ①	炭疽病 うどんこ病 アブ・ラムシ類 アザミヤマ類 等	予 アントラコール顆粒水和剤 ハチハチフロアブル	500倍 1,000倍	仮植栽培期 1番花の開花まで	6回 1回	1日 5日	5日以上	-	7日 40日以上
	炭疽病 灰色かび病 等	予 オーソサイド水和剤80 ※フーモンと混用不可(薬害)	800倍	収穫開始 14日前	5回	1日	0日	0日	0日
5月 ②	炭疽病 ミカンキイロアザミヤマ ハダニ類 等	予 コテツフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	2,000倍	前日	2回	10日	9日	14日	14日
	炭疽病 じやのめ病 アブ・ラムシ類 ハダニ類	予 ジマンダイセン水和剤 ロディー乳剤	600倍 1,000~ 2,000倍	仮植栽培期 (但し収穫 76日前)	6回 3回	3日 - 0日	0日	14日 60日以上	14日 84日
5月 ④	炭疽病 うどんこ病 ハダニ類 等	予・治 ゲッター水和剤 フーモン ※野菜類登録	1,000倍 1,000倍	収穫開始 21日前 前日	3回 - 3回	0日 0日	1日	14日	0日
	炭疽病 等 ハダニ類 等	予・治 アミスター20フロアブル トクチオン乳剤	2,000倍 1,000倍	親株育成期 75日前	3回 3回	0日 - 1日	1日	0日 30日以上	0日
6月 ①	炭疽病 ハダニ類 等	予 ジマンダイセン水和剤 アグリメック	600倍 500~ 1,000倍	仮植栽培期 (但し収穫 76日前) 親株育成期	6回 2回	3日 14日	0日 7日	14日	7日
	ハダニ類								

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

展着剤登録あります！

フーモン

気門封鎖剤を利用して
他剤の使用回数を抑えましょう！

野菜類登録
アブ・ラムシ類・ハダニ類
コナジミヤマ類・うどんこ病
1,000倍/収穫前日
回数制限なし ハロ日



※高温注意



※混用不可薬剤あり

ハダニ類徹底防除のポイント！

- 薬剤は、葉裏を中心にたっぷり散布する。
- 発生予防のため、定期的に薬剤を散布する。
- 気門封鎖剤を活用し、感受性低下を防ぐ。
- 本園で使う薬剤は極力使用しない。



ナミハダニ多発時