



ミニトマト編

病害虫注意報 2022年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

暖かくなると天窓の開閉が多くなり、コナジラミ類の飛び込みが増えます。コナジラミ類が媒介するウイルス病は、発病してしまうと**治療できません**。**感染が疑われる株は速やかに除去**しましょう。
気になる症状は病害虫診断室でお調べします！

黄化葉巻病(TYLCOV)

ハコナジラミ(ハイタイプ[®] B,Q)により媒介



- ▶ 芽先が黄化・葉巻症状
- ▶ 節間がつまる

抵抗性品種では
症状の判断が難しい
ので要注意!!

黄化病(ToCV)

コナジラミ類(ハシツ・ハバコ)により媒介



- ▶ 葉脈間の黄化
- ▶ 進行するとえそ症状が発生

中下位葉に出やすく、
マグネシウム欠乏症と
似た症状です。

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ
5月 ①	灰色かび病・葉かび病 すすかび病 等	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍	前日	3回	1日
	アブラムシ類 コナジラミ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日	3回	0日
5月 ②	うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
	コナジラミ類・アブラムシ類	バリアード顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	1日
5月 ③	灰色かび病 葉かび病・菌核病	カンタスドライフロアブル	1,000~1,500倍	前日	3回	0日
	ミカンハダガミ コナジラミ類 等	アニキ乳剤	1,000~2,000倍	前日	3回	1日

高温対策に!

すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防!
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ!
10a当たり10~20錠

効果の持続は約1か月



エレマックス赤

軟弱徒長株を強く!

0-28-26

1,000倍 葉面散布

花芽分化・着果(花)の向上に!

樹を締めて徒長防止!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤等との混用は避けてください
※カテキンパワーとの混用は可能です



肥料登録
輸第9423号

展着剤登録あります!

フーモン

気門封鎖剤を利用して
他剤の使用回数を抑えましょう!



野菜類登録
アブラムシ類・ハダガミ類
コナジラミ類・うどんこ病
1,000倍/収穫前日
回数制限なし 1日0日

※高温注意
※混用不可薬剤あり