



イチゴ編

病害虫注意報 2022年7月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



育苗期の徹底防除で、本圃への病害虫の持ち込みを防ぎましょう！



ランナー切り離し後 おすすめローテーション①

切り離し後から育苗期がスタートです！

※ランナー切り離し後から農薬のカウントが始まります。回数にお気を付けください ※

時期	IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	刊
7月 ③	11	炭疽病 等 予・治	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000倍	前日	3回	1日		0日	
	13	ハダニ類・ハモシヨウ 等	コテツフロアブル	2,000倍	前日	2回	10日	9日	14日	
7月 ④	M03	炭疽病 予	アントラコール顆粒水和剤	500倍	仮植 栽培期	6回	1日		-	7日
	-	ハダニ類・アブラムシ類 うどんこ病 等	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日			0日
8月 ①	M03	炭疽病 じゃのめ病 予	ジマンダイセン水和剤	600倍	仮植 栽培期 (76日前)	6回	3日	0日		14日
	1B	ハダニ類 等	トクチオン乳剤 卵にも効果あり	1,000倍	75日前	3回	-	1日		30日
8月 ②	40	疫病 予	レーバスフロアブル	2,000倍	育苗期	苗床: 2回	1日			-
	6	ハダニ類	アグリメック	500~ 1,000倍	育苗期	2回	14日	7日		7日

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

育苗期 疫病対策！

疫病とみられる症状が増えています

◇POINT◇

リトミルゴールドMZ (1,000倍/育苗期/3回)

レーバスフロアブル (2,000倍/育苗期/苗床2回)

等を使用し、本圃に感染苗を持ち込まないことが重要です！



光合成能力UP！

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム

+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！
★日照不良時の代謝の向上！



肥料登録
生第87201号