



# キャベツ編



## 病害虫注意報 2022年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### チョウ目害虫対策

キャベツのチョウ目害虫の発生が多くなると予想されています。  
高温小雨の時は多発に注意しましょう。



オオタバコガ

- ・幼虫は体色が黒っぽくまばらに生えた毛が目立つ
- ・幼虫は作物に穴をあけて潜り込む性質



シロイチモジヨトウ

- ・幼虫は体の側面に白い筋が1本通っている
- ・幼虫は狭い場所を好み新葉に入る場合もある



ハスモンヨトウ

- ・幼虫は卵塊で(数百個)で産卵する
- ・幼虫は背中に1対の黒い斑紋がある
- ・食欲旺盛で集団で食害を起こす

### チョウ目害虫おすすめ防除ローテーション

時期	RACコード	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
①	28	シロイチモジヨトウ・ハスモンヨトウ コガ・オオタバコガ 等	兼商ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍	前日	3回
②	30	ハスモンヨトウ・オオタバコガ コガ・アムシ 等	ブフロアSC	2,000~4,000倍	前日	3回
③	6	シロイチモジヨトウ・ハスモンヨトウ コガ・オオタバコガ 等	アニキ乳剤	1,000~2,000倍 シロイチモジヨトウ:2,000倍	3日前	3回
④	13	シロイチモジヨトウ・ハスモンヨトウ オオタバコガ・アムシ 等	コテツフロアブル	2,000倍	前日	2回

### その他おすすめ薬剤

RACコード	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
30	ハスモンヨトウ・オオタバコガ コガ・アムシ 等	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	7日前	2回
22A	ハスモンヨトウ・ハマダラメカガ ヌナギンウバ 等	トルネードエースDF	2,000倍	7日前	2回
6	ハスモンヨトウ・コガ ハマダラメカガ・アムシ 等	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	前日	3回
15	ハスモンヨトウ・ハマダラメカガ コガ・ヨウムシ・アムシ	マッチ乳剤	2,000~3,000倍 (ハスモンヨトウ・オオタバコガは3,000倍)	7日前	3回
5	ハスモンヨトウ・オオタバコガ コガ・アムシ 等	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回

### ミネクトデュオ粒剤

育苗期~定植初期の害虫総合防除剤!

大型規格(12kg)登場!

規格: 12kg

適用害虫: コガ・ハマダラメカガ

アムシ・アブラムシ類等

使用時期: は種時・定植時等

回数: 1回

大型規格登場!



弱った株の回復に!

### カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!

カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した植物活力資材

