



# キャベツ編

## 病害虫注意報 2022年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### チョウ目・細菌病対策

今月も引き続きチョウ目には注意しましょう。特に秋に向かい発生が増えるコナガには要注意です。また発生適温になる細菌病も増えてくるため、予防的な散布を心掛けましょう。

#### コナガ



#### 被害

- ▶ 薄皮や葉脈を残した食害
- ▶ 結球前の中心葉に隠れ、新芽を食害

#### 多発条件

- ▶ 25～30℃程度
- ▶ 少雨

#### 黒腐病



#### 症状

- ▶ 葉縁のV字病斑
- ▶ 維管束の黒変

#### 多発条件

- ▶ 台風などによる激しい風雨
- ▶ 虫害の酷い圃場  
傷口から病原菌が侵入

### 今月のおすすめローテーション

対象害虫によって使用倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
10月①	M01	黒腐病	兼商クプロシールド※	1,000～2,000倍	—	—
	30	コナガ・オタバコガ ハモエトウ・アムシ 等	グレースア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回
10月②	31	軟腐病・黒斑細菌病	スターナ水和剤	1,000倍	7日前	3回
	6	コナガ・ハモエトウ・アムシ ハマダラメカガ 等	アフアム乳剤	1,000～2,000倍	前日	3回
10月③	U18	黒腐病・軟腐病・株腐病	バリダシン液剤 5	800倍	7日前	5回
	5	コナガ・ハモエトウ オタバコガ・アムシ 等	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
10月④	7	菌核病・株腐病・根朽病	アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回
	14	コナガ・アラムシ類 ナメジリ類・アムシ 等	リーフガード顆粒水和剤	1,500倍	7日前	3回

※結球期以降散布不可(薬害):結球あぶらな科葉菜類登録

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した植物活力資材

## カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！  
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録：生第91402号

## 海藻サンバ

育苗期・生育期:1,000倍

イノチオの新しいバイオステュミラント！  
育苗期の発根促進剤

- ▶ コリンによる光合成促進と発根促進
- ▶ 海藻エキスによる発根促進
- ▶ 転流を促進

肥料登録番号 生第101491号