



キャベツ編

病害虫注意報 2022年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

べと病・菌核病 対策

人間にとって過ごしやすい15～20℃の気温ではべと病、菌核病の発生が多くなります。
発病に注意して予防的な散布を行いましょ！



べと病

症状

- ▶ 葉脈に区切られた淡黄褐色の病斑
- ▶ 病斑の裏側に汚白色のかび

多発条件

- ▶ 9時間以上葉面が濡れた状態



菌核病

症状

- ▶ 結球初期から発病
- ▶ 下葉の基部に水浸状病斑
- ▶ 白い綿毛状のかび
- ▶ ネズミ糞状の菌核

多発条件

- ▶ 前作発病した圃場
- ▶ 軟弱徒長

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって使用倍率が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	2	菌核病・株腐病	予 ロブルール水和剤	1,000倍	7日前	4回
②	U17	べと病 ピシウム腐敗病	予・治 ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回
③	12	菌核病・株腐病	予 セイビアーフロアブル20	1,000倍	3日前	3回
④	7,11	べと病・菌核病 株腐病・黒斑病	予・治 シグナムWDG※	1,500倍 べと病：1,500～2,000倍	7日前	2回

※シグナムWDGはカンタスDFと合わせて2回

チョウ目害虫にお困りの場合は・・・

RAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
5	コガ・オタバコガ ウバ類・アオムシ 等	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
6	コガ・ハスモンヨトウ 等	アファーム乳剤	1,000～2,000倍	前日	3回
23	コガ・アオムシ アブラムシ類・アザミウマ類	モベントフロアブル	2,000倍 アブラムシ類：2,000～4,000倍	7日前	3回
30	コガ・オタバコガ 等	ブロフレアSC	2,000～4,000倍	前日	3回
30	コガ・オタバコガ ハイマダラノメカガ 等	グレーシア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回

弱った株の回復に！

カテキンパワー 1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
かびの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストロブトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した植物活力資材



肥料登録 生第91402号

光合成能力UP！

ファイトマジック 1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素
★葉にテリツヤ・厚みUP！
★日照不良時の代謝の向上！



肥料登録 生第87201号