



キュウリ編

天敵未導入版

inochio GROUP

病害虫注意報 2023年2月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春にかけてアザミウマ類の発生が多くなりやすい時期です。
発生を確認したら密度の低いうちに防除しましょう。

防除のポイント

- ・青色粘着板、防虫ネットの設置
- ・ハウス周りの除草
- ・アザミウマ類が寄生しやすい新芽を確認し、密度が低いうちから防除。



黄化えそ病



アザミウマ類成虫

今月のおすすめローテーション

天敵導入されない方向けです！
導入される方は別紙をご確認ください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍率	使用時期	回数	影響日数 スルスキー
2月①	U17	べと病 予・治	ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回	0日
	23	アブラムシ類・ハダニ類 アザミウマ類・コナジラミ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	30日
2月②	11, M05	べと病・うどんこ病 菌核病・褐斑病 等 予・治	アミスターオプティフロアブル	1,000倍	前日	4回	—
	6	アザミウマ類・ハダニ類 コナジラミ類	アグリメック	500~1,000倍	前日	2回	7日
2月③	7	うどんこ病・褐斑病 つる枯病 等 予	ケンジャフロアブル	1,500倍	前日	4回	0日
	13	ミナキハアザミウマ シロアザミウマ 等	コテツフロアブル	2,000倍	前日	3回	14日
2月④	12	灰色かび病・菌核病 予・治	セイビアーフロアブル20	1,000~1,500倍	前日	3回	0日
	4C	コナジラミ類・アブラムシ類	トランスフォームフロアブル	1,000~2,000倍 アブラムシ類：2,000倍	前日	2回	—

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

ファイトメット

成り疲れ対策！

100~150g/10a
または
2,000~3,000倍灌注

- ▶毛細根の充実に！
- ▶リン酸・ミネラル分の吸収アップに！



肥料登録
輸第84050号

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す！

NEW-SB酸素

初期の活着時や高温期に
灌水処理がお勧め！

10kg/10a
7~10日おき灌水処理



ガイア蘇生

成り疲れ対策！

10~14日に1回
1kg/10a灌注

- ・静菌・静虫作用
- ・側根誘導

毛細根の発達により
成り疲れを予防



規格：20kg