



キャベツ編

病害虫注意報 2023年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目・細菌病対策

病害虫（コナガ、ハスモンヨトウ、黒腐病など）の生育適温となり多発する可能性があります。予防的なローテーション散布を行い、発生前から防除していきましょう。



コナガ

被害

- ▶ 薄皮や葉脈を残した食害
- ▶ 結球前の中心葉に隠れ、新芽を食害

多発条件

- ▶ 20～25℃程度
- ▶ 少雨



黒腐病

症状

- ▶ 葉縁のV字病斑
- ▶ 維管束の黒変

多発条件

- ▶ 台風などによる激しい風雨
- ▶ 虫害の酷い圃場
傷口から病原菌が侵入

今月のおすすめローテーション

対象害虫によって使用倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
10月①	M01	黒腐病・黒斑細菌病	予 兼商クプロシールド※	1,000～2,000倍	—	—
	5	コナガ・オタバコガ ハスモンヨトウ・アムシ等	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
10月②	31	黒斑細菌病・軟腐病	予 スターナ水和剤	1,000倍	7日前	3回
	30	シロイモシヨトウ・コナガ ハスモンヨトウ・オタバコガ等	ブロフレアSC	2,000～4,000倍	前日	3回
10月③	U18	黒腐病・軟腐病・株腐病	予 バリダシン液剤5	800倍	7日前	5回
	6	コナガ・ハスモンヨトウ トウモロコシ・ハマダラメカイ等	アフアーム乳剤	1,000～2,000倍	前日	3回
10月④	7	菌核病・株腐病 灰色かび病・根朽病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回
	14	コナガ・アブラムシ類 ナメクジ類・アムシ等	リーフガード顆粒水和剤	1,500倍	7日前	3回

※兼商クプロシールドは結球期以降散布不可(薬害)、結球あぶらな科葉菜類登録

雨風で傷んだ植物体のケアにおすすめ！

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

茶葉から抽出した
植物活力資材

- ▶ 大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆
- ▶ 定植後、高温が続くような時の散布も効果的！

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避けてください。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避けてください。



肥料登録
生91402号