



キャベツ編

病害虫注意報 2023年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ベと病・菌核病 対策

11月以降はベと病、菌核病の発生が多くなります。
発病に注意して予防的な散布を行いましょ！



ベと病

症状

- ▶ 葉脈に区切られた淡黄褐色の病斑
- ▶ 病斑の裏側に汚白色のかび

多発条件

- ▶ 9時間以上葉面が濡れた状態



菌核病

症状

- ▶ 結球初期から発病
- ▶ 下葉の基部に水浸状病斑
- ▶ 白い綿毛状のカビ
- ▶ ネズミ糞状の菌核

多発条件

- ▶ 過湿
- ▶ 前作発病した圃場
- ▶ 軟弱徒長

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって使用倍率が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

順番	RAC	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	2	菌核病・株腐病	予 ロブラール水和剤	1,000倍	7日前	4回
②	7,11	菌核病・株腐病 黒斑病・ベと病	予・治 シグナムWDG※	1,500倍 ベと病1,500~2,000倍	7日前	2回
③	U17	ベと病・ピシウム腐敗病	予・治 ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回
④	12	菌核病・株腐病	予 セイビアーフロアブル20	1,000倍	前日	3回

※シグナムWDGはカンタスDFと合わせて2回

チョウ目害虫にお困りの場合は・・・

RAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
5	コガ・オタバコガ ハスモンヨトウ・アオムシ等	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回
6	コガ・アオムシ・ハマダラメカ等	アファーム乳剤	1,000~2,000倍	前日	3回
15	コガ・ヨウムシ アオムシ等	マッチ乳剤	2,000~3,000倍	7日前	3回
23	コガ・アブラムシ類 アザミウマ類・アオムシ	モベントフロアブル	2,000~4,000倍 アザミウマ類・アオムシ2,000倍	7日前	3回
30	ヨイモジヨトウ・コガ ハスモンヨトウ・オタバコガ等	ブロフレアSC	2,000~4,000倍	前日	3回
	コガ・オタバコガ ヨイモジヨトウ等	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍 ヨイモジヨトウ2,000倍	7日前	2回

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素

- ★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！
- ★日照不良時の代謝の向上！

肥料登録
生第87201号



ファイトカル

1,000倍 葉面散布

- ★有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム
- ★優れた展着性・浸透性
- ★チップバーン対策におすすめ

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用不可

肥料登録
生第83188号

