



キャベツ編

病害虫注意報 2024年4月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナガ・ナメクジ 対策



被害

- ▶ 薄皮や葉脈を残した食害をする。
- ▶ 生長点へ侵入する個体もある。

多発条件

- ▶ 15～25℃の気温（生育最低10℃）
- ▶ やや乾燥（少雨）



被害

- ▶ 葉を加害し、大きな穴が空く。
- ▶ 葉に這った後、粘膜の筋が乾燥して銀色に光って見える。

多発条件

- ▶ 湿潤条件
- ▶ 梅雨時期
- ▶ 残渣・雑草が圃場にある場合

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

順番	IRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	回数
①	6	コナガ・アオムシ ハイマダラノメイガ 等	アフーム乳剤	1,000～2,000倍	前日	3回
②	14	コナガ・アブラムシ類 ナメクジ類・アオムシ 等	リーフガード顆粒水和剤	1,500倍	7日前	3回
③	30	シイマイヨトウ・コナガ ハスモンヨトウ・オオタバコガ 等	ブロフレアSC	2,000～4,000倍	前日	3回
④	5	コナガ・オオタバコガ ハスモンヨトウ・アオムシ 等	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回

その他のおすすめ薬剤

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

対象病害虫	RAC	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	回数
コナガ	6	アニキ乳剤	1,000～2,000倍	3日前	3回
	15	マッチ乳剤	2,000～3,000倍	7日前	3回
	22A	トルネードエースDF	1,000～2,000倍	7日前	2回
	23	モベントフロアブル	2,000～4,000倍	7日前	3回
	30	グレーシア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回
ナメクジ類	—	ナメククリーン3	1～3kg/10a 株元散布	14日前	2回
	14	パダンSG水溶剤	1,500倍	14日前	4回
	M01	兼商クプロシールド	1,000倍	発生前～発生初期	—

ナメクジについて

植物体に光沢を帯びた跡（粘液）があるとナメクジがいる証拠！



耕種的防除

- 狭い圃場であれば、捕殺する（素手で触れない）。
- 作物残渣や圃場周辺の雑草を除去する。
- 過度な有機質肥料の施用は控える。
- 圃場の排水不良は改善する。

ナメクジ類は昼間は土中や植物残渣の下に潜み、夜間に活動する。また、季節や天候によって活動性が大きく異なる。

はじめ
大好き！

